

در صورتی که شما در دستگاه گوارش فوقانی **خود** مشکلاتی مانند : درد در ناحیه ی معده، شکم، سختی در بلعیدن غذا، استفراغ، خونریزی، زخم، توده دارید، آندوسکوپی روشی برای مشاهده ی اجزاء داخلی بدن می باشد و در تشخیص یا درمان بیماری شما کمک کننده است.

آندوسکوپ چیست؟

آندوسکوپ یک لوله ی طویل و نازک بوده که قابلیت انعطاف داشته و تصاویر را دریافت می کند.

جزئیات تصاویر از طریق یک نمایشگر به پزشک در تشخیص مشکل شما کمک می نماید . از طریق آندوسکوپ برداشتن پولیپ امکان پذیر است ؛ اگر منبع یک زخم هم پیدا شود به توسط آندوسکوپ سوزانده می شود تا خونریزی متوقف گردد ؛ اگر پزشک بافت مشکوکی را مشاهده نماید از آن نمونه برداری میکند که به این عمل بیوپسی گویند.

برداشتن بیوپسی روش سودمندی است که در تشخیص رشد غیر عادی سلول ها به کار میرود؛ همچنین آندوسکوپی باکتری

هایی را که زخم های گوارشی را ایجاد میکنند را معین مینماید.

آیا بعد از آندوسکوپی نیاز به بستری شدن داریم؟

آندوسکوپی معمولاً به عنوان یک روش سرپایی محسوب می گردد بدین معنی که شما بعد از انجام آن می توانید به منزل خود مراجعه نمایید این عمل ممکن است در مطب پزشک یا بیمارستان انجام شود.

قبل از آندوسکوپی:

قبل از هر چیز با پزشکتان در مورد مشکل و بیماری خاصی که دارید یا دارویی که مصرف میکنید، صحبت کنید . زیرا مشکلات مربوط به ریه ها و قلب ممکن است قبل یا در طول آندوسکوپی یا بعد از آن ، به درمان خاصی نیاز داشته باشد . بعضی از افراد ، قبل از این مراحل نیازمند آنتی بیوتیک میباشند.

اگر شما از دارویی استفاده می کنید می بایست

از پزشکتان سوال نمایید که آن را قبل از آندوسکوپی میتوانید مصرف نمایید یا خیر؟

قبل از انجام آندوسکوپی نباید از آسپرین و ایبوپروفن استفاده کنید . فرآورده هایی شبیه به آن را 7 روز قبل از آندوسکوپی مصرف نکنید، چرا که این محصولات خطر خونریزی را در طول آندوسکوپی افزایش می دهند . **پس از اتمام**

آندوسکوپی پزشک معالج به شما خواهد گفت که چه زمانی از داروهایتان می توانید دوباره استفاده نمایید.

***8 ساعت قبل از آندوسکوپی نباید چیزی بخورید یا نوشیدنی بیاشامید.**

***از نیمه شب قبل از آندوسکوپی نباید سیگار بکشید.**

***چرا باید در طی آندوسکوپی معده ما خالی باشد؟**

***وجود غذا در دستگاه گوارش فوقانی از مشاهده قسمت مورد نظر جلوگیری می نماید به علاوه باعث استفراغ و بروز مشکلات پیچیده ای میشود.**

حين آندوسکوپی:



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

بیمارستان امام حسین (ع) همدان

آندوسکوپی



IHH-PE-PA-CL14

واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

شماره تلفن: ۰۸۷۴۸۲۳۶۰۶۸

آدرس وب سایت بیمارستان:

<https://muk.ac.ir/Page?pagelid=۲۳>

وارد مینماید تا پزشک بهتر بتواند داخل معده ی شما رامشاهده کند.

مری، معده با دقت در طول آندوسکوپی مشاهده می شوند .پزشک شما،نواحی ای را که به ارزیابی و تشخیص و درمان نیاز دارد، با دقت مشاهده می کند .در این حالت پزشک التهاب، خونریزی یا رشد غیر عادی را می تواند مشاهده نماید.

بعد از آندوسکوپی:

*تا برگشت بیحسی چیزی نخورید.

*هنگامی که آماده می شوید تا به خانه بروید شما رانندگی ننمایید.

در صورت مشاهده علائم زیر پزشک معالج

خود را با خبر کنید:

بلع _ دردناک، _ گلوی _ متورم، _ درد _ قفسه ی
سینه، استفراغ، تب _ و _ مدفوع سیاه _ یا _ بسیار _
تیره _

منبع: برونر سوارث

قبل از شروع کار به شما یک داروی آرامبخش داده می شود تا آرام باشید . سعی کنید که آرامش خود را حفظ کنید، معمولاً بیشتر بیماران در طی جریان کار می خوابند. از شما درخواست خواهد شد که پیراهن خود را خارج نمایید و از یک روپوش استفاده کنید.

همچنین اگر از عینک یا دندان مصنوعی یا چیزهای دیگری هم استفاده می نمایید می بایست آنها را خارج سازید.

شما باید به پهلویچپ دراز بکشید پزشک به صورت موضعی ، حلق شما را بی حس میکند .این کار با یک اسپری یا یک دارو انجام میشود.

شما در طول این جریان نباید احساس درد نمایید و باید خودتان قادر باشید که نفس بکشید.

وقتی که آندوسکوپ در بدن شما قرار گرفت شما احساس فشار می کنید، بدلیل این که آندوسکوپ مقداری هوا به درون معده شما

